

د واکسينو د معلوماتو بيانیه

Many vaccine information statements are available in Pashto and other languages. See www.immunize.org/vis

د واکسينو په اړه ډېر معلوماتي بيانونه په پښتو او نورو ژبو کې د لاسرسۍ وړ دي. www.immunize.org/vis وگورئ

د نيوموکوکل کنجوگېټ واکسين: هغه څه چې تاسو يې په اړه بايد پوه شئ

1. ولې بايد واکسين وکړو؟

د نيوموکوکل کنجوگېټ واکسين کولی شي د نيوموکوکل د ناروغۍ مخنيوی وکړي.

نيوموکوکل ناروغي هغې ناروغۍ ته ويل کېږي چې د نيوموکوکل باکټريا له امله رامنځته کېږي. دا باکټريا کولی شي د گڼو ناروغيو لامل شي، لکه:

- سينه بغل (د سږو انفېکشن)
- د غوږونو انفېکشنونه
- د سينوس انفېکشنونه
- مننژيت (د هغه نسج انفېکشن چې ماغزه او نخاعي رگ پوښي)
- بيکټريما (د وينې د جريان انفېکشن)

هر څوک په نيوموکوکل ناروغۍ اخته کېدای شي، خو کوچني ماشومان، مشران او هغه کسان چې د خطر ځانگړي فکتورونه لري، تر ټولو زيات د دې ناروغۍ له خطر سره مخ دي.

زياتره د نيوموکوکل انفېکشنونه معتدل وي. په هرصورت، ځينې يې د اوږدې مودې ستونزو لامل کېدای شي، لکه د ماغزو زيان يا د د اورېدو ضايع. مننژيت، بيکټريما او سينه بغل چې د نيوموکوکل ناروغۍ له امله رامنځته کېږي، د مړينې لامل کېدای شي.

2. د نيوموکوکل کنجوگېټ واکسين

د نيوموکوکل کنجوگېټ واکسين د هغه باکټريا په وړاندې په ساتنه کې مرسته کوي چې د نيوموکوکل ناروغۍ لامل کېږي. يوڅو د نيوموکوکل کنجوگېټ واکسين (PCVs) شتون لري. د ځانگړي PCV او د توصيه شويو دوزونو شمېر د يو کس د عمر، د واکسيناسيون تاريخ، او طبي حالت پراساس دي. ستاسو د روغتيايي پاملرنې چمتو کوونکي له تاسو سره په ټاکولو کې مرسته کولی شي چې د PCV کوم ډول او څومره خوراگونه بايد ترلاسه شي.

- تېخور ماشومان او تنکي ماشومان معمولاً د PCV څلور دوزو ته اړتيا لري. دا خوراگونه د 2، 4، 6 او 12 - 15 مياشتو په عمر کې سپارښت کېږي.
- ځينې لوی ماشومان او تنکي ځوانان چې تېخور ماشومانو او تنکي ماشومانو په توگه يې توصيه شوي دوزونه نه دي ترلاسه کړي، PCV ته اړتيا لري. دا په عمر، طبي حالاتو او د خطر په نورو فکتورونو پورې اړه لري.

▪ هغه بالغان چې د 19 څخه تر 49 کلونو پورې عمر لري او PCV يې نه دي ترلاسه کړي او ځينې طبي حالتونه يا نور د خطر عوامل لري بايد PCV ترلاسه کړي. په دې گروپ کې ځينې لويان چې مخکې يې PCV ترلاسه کړي دي، ښايي د بل دوز سپارښتنه ورته وشي.

▪ لويان 50 کلن يا تر دې زيات عمر لرونکي چې مخکې يې PCV نه دي ترلاسه کړي، بايد PCV واکسين ترلاسه کړي. په دې گروپ کې ځينې لويان چې مخکې يې PCV ترلاسه کړي دي، ښايي د بل دوز سپارښتنه ورته وشي.

3. د خپلې روغتيايي پاملرنې له چمتو کونکي سره خبرې وکړئ

د واکسينو چمتو کوونکي ته خبر ورکړئ که چېرې واکسين کيدونکی شخص:

- د هرډول PCV د مخکيني خوراک وروسته، يا له ډيفټريا توکسايد واکسين (د مثال په توگه، DTaP) څخه حساسيت لري دي، يا کوم شديدي، ژوند گواښونکي حساسيت لري

په ځينو مواردو کې، ستاسو د روغتيايي پاملرنې چمتو کوونکی ممکن پرېکړه وکړي چې PCV تر راتلونکي ليدنې پورې وځنډوي.

د زکام په څېر د کوچنيو ناروغيو لرونکي خلک واکسين کېدای شي. هغه کسان چې په منځني ډول يا سخت ناروغه وي زياتره تر رغيدو پورې انتظار بايد باسي.

ستاسو روغتياپال کولی شي په دې اړه تاسو ته ډېر معلومات درکړي.



U.S. CENTERS FOR DISEASE
CONTROL AND PREVENTION

4. د واکسين د عکس العمل خطرونه

■ سوروالی، پرسوب، درد، یا خوږوالی په هغه ځای کې چې ستن وهل کېږي؛
تبه؛ د اشتها له منځه تلل؛ بې قراري (بې صبرۍ)؛ ستړیا؛ د سر درد؛ د عضلو
درد؛ د بندونو درد؛ یا لږزه کېدای شي د نیوموکوک واکسين تر تطبیق وروسته
رامنځته شي.

کوچني ماشومان د PCV وروسته د تبې له امله د غوټو له زیات خطر سره
مخ کېدای شي که چیرې دا د غیر فعال انفلونزا واکسين سره په ورته وخت
کې ورکړل شي. د نورو معلوماتو لپاره له خپل روغتيايي پاملرنه کوونکي څخه
پوښتنه وکړئ.

خلک ځینې وختونه د واکسينو په ګډون له ځینو روغتيايي کړنلارو وروسته بې
هوښه کېږي. که په تاسو سرګرځېږي، یا مو د لیدلو په حس کې بدلون یا مو په
غوږونو کې کړنګار لرئ، نو خپل چمتو کوونکي ته ووايئ.

لکه د نورو درملو سره، واکسين هم په ډېر نادره توګه له سخت حساسیت، نورو
جدي ټپونو، یا مړینې سبب ګرځېدای شي.

5. که چیرې کومه جدي ستونزه وي نو څه به پېښ شي؟

د واکسين شوي کس له کلینیک څخه د وتلو وروسته الرجیک عکس العمل
رامنځته کېدی شي. که تاسو د جدي عکس العمل نښې لکه (ګرمکۍ، د مخ
او ستوني پرسوب، تنفسي ستونزې، د زړه چټک ضربان، سربدالي، یا کمزوري)
ولیدلې نو 1-9 شمېرې ته زنگ ووهئ او اړوند شخص تر ټولو نږدې
روغتون ته انتقال کړئ.

د نورو نښو لپاره چې تاسو انډینېمن کوي، خپل روغتيايي پاملرنې چمتو کوونکي
ته زنگ ووهئ.

منفي عکس العملونه باید Vaccine Adverse Event Reporting
System (VAERS) (د واکسين د منفي پېښو راپور ورکولو سیستم)
ته راپور شي. ستاسو د روغتيايي پاملرنې چمتو کوونکي به معمولا دا راپور
ثبت کړي، یا تاسو دا پخپله کولی شئ. له VAERS وېب سایټ څخه په دې
پته لېږنه وکړئ www.vaers.hhs.gov یا دې شمېرې ته زنگ ووهئ
1-800-822-7967 VAERS یواځې د عکس العملونو په اړه د راپور
ورکولو لپاره دی، او د VAERS کارکوونکي روغتيايي مشورې نه ورکوي.

National Vaccine Injury Compensation Program

National Vaccine Injury Compensation Program

(VICP) (د واکسين له امله د ناروغ کیدو د جبران ملي پروګرام) یو فدرالي
پروګرام دی چې د هغو خلکو د جبران لپاره رامینځته شوی چې ممکن د ځینو
واکسينونو له امله ورته زیان رسیدلی وي. د واکسينو له امله د ادعا شوي زیان یا
ناروغ کیدو یا مړینې په اړه ادعاوې د ثبتولو لپاره د وخت محدودیت لري، کوم
چې ممکن د دوو کلونو په څیر لنډ وي. د VICP وېب سایټ ته په دې پته
ورسئ www.hrsa.gov/vaccinecompensation یا دې شمېرې
ته زنگ ووهئ 1-800-338-2382 ترڅو د پروګرام په اړه او د ادعا د
ثبتولو په اړه معلومات ترلاسه کړئ.

7. زه څنګه نور معلومات زده کولی شم؟

- د خپلې روغتيايي پاملرنې له چمتو کوونکي څخه پوښتنه وکړئ.
- خپل سیمه ایز یا ایالتي روغتيايي څانګې ته زنگ ووهئ.
- د واکسينو د کڅوړې او په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د
Food and Drug Administration (FDA)
(خوړو او درملو ادارې) اړوند دې وېب پاڼې ته ورسئ
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
(د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو) سره اړیکه ونیسئ:
- زنگ ووهئ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) یا
- د CDC وېب سایټ ته په دې پته ورسئ
www.cdc.gov/vaccines

