

Inmunizaciones para bebés

Guía para padres

¡Estas son las vacunas que necesita su bebé!

Al nacer ^{1,2}	HepB + mAb contra el VSR ¹ 0-7 meses										
2 meses ^{1,2}	HepB ^{1-2 meses} ² + DTaP + PCV + Hib + Polio + RV										
4 meses ^{1,2}	HepB ³ + DTaP + PCV + Hib + Polio + RV										
6 meses ^{1,2}	HepB ^{6-18 meses} ² + DTaP + PCV + Hib ⁴ + Polio ^{6-18 meses} ² + RV ⁵ + Influenza ⁶ + COVID ⁷										
12 meses y más ^{1,2}	MMR (triple) ^{12-15 meses} ² + DTaP ^{15-18 meses} ² + PCV ^{12-15 meses} ² + Hib ^{12-15 meses} ² + Varicela ^{12-15 meses} ² + HepA ⁸ ^{12-23 meses} ² + Influenza ⁶ + COVID ⁷										

- Consulte a su médico o al personal de enfermería para asegurarse de que su bebé reciba todas las vacunas a tiempo. En muchas ocasiones, las vacunas se combinan para reducir las inyecciones. No olvide solicitar una cartilla de vacunación con las fechas de las vacunas de su bebé y llévela a cada visita.

Esta es una lista de las enfermedades contra las cuales estará protegido su bebé:

HepB: hepatitis B, una enfermedad grave del hígado

DTaP: difteria, tétanos y tos ferina (pertusis)

PCV: vacuna conjugada antineumocócica; protege contra una infección grave de la sangre, los pulmones y el cerebro

Hib: *Haemophilus influenzae* tipo b: una infección grave del cerebro, la garganta y la sangre

Polio: poliomiелitis; una enfermedad paralizante grave

VSR: virus sincicial respiratorio, una infección pulmonar grave

RV: infección por rotavirus; una enfermedad diarreica grave

Influenza: una infección pulmonar grave

MMR (triple): sarampión, paperas y rubéola

COVID-19: una enfermedad infecciosa potencialmente grave

HepA: hepatitis A; una enfermedad grave del hígado

Varicela: también se conoce como “viruela loca”

Notas del cuadro anterior:

1. Los bebés desde el nacimiento hasta los 7 meses de edad pueden necesitar anticuerpos preventivos contra el VSR (mAb contra el VSR) antes o durante su primera temporada de VSR si la vacuna contra el VSR no se administró durante el embarazo. Ciertos niños mayores de 8 a 19 meses de edad pueden necesitar mAb contra el VSR antes de su segunda temporada de VSR.
2. El intervalo de edad en el que debe administrarse esta vacuna.
3. Es posible que el bebé no necesite una dosis de la vacuna contra la hepatitis B a los 4 meses de edad, según la vacuna utilizada. Consulte a su médico o al personal de enfermería.
4. Es posible que el bebé no necesite una dosis de la vacuna Hib a los 6 meses de edad, según la vacuna utilizada. Consulte a su médico o al personal de enfermería.
5. Es posible que el bebé no necesite una dosis de la vacuna RV a los 6 meses de edad, según la vacuna utilizada. Consulte a su médico o al personal de enfermería.
6. Todos los niños de 6 meses y más deberán ser vacunados contra la influenza en el otoño o invierno de cada año.
7. Usted y el médico o el personal de enfermería de su hijo deben conversar sobre la COVID-19 estacional cada año para decidir si su hijo debe ser vacunado.
8. Su hijo necesitará 2 dosis de la vacuna HepA, administradas con al menos 6 meses de diferencia.

